



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

НОБАЗИТ®

(торговое наименование лекарственного препарата)

таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг

(лекарственная форма, дозировка)

ОАО «Ирбитский химфармзавод», Россия

ООО «Авексима Сибирь», Россия

(наименование производителя, страна)

ИЗМЕНЕНИЕ № 1

Дата внесения Изменения «130421» 202 г.

Старая редакция	Новая редакция
Регистрационный номер: Торговое наименование: НОБАЗИТ®	Регистрационный номер: ЛП-006416 Торговое наименование: НОБАЗИТ® ФОРТЕ
Состав Одна таблетка содержит: <i>действующее вещество:</i> N-метил-4-бензилкарбамидопиридиния йодид (Энисамия йодид) – 500,0 мг; <i>вспомогательные вещества (ядро):</i> лактозы моногидрат – 133,6 мг, целлюлоза микрокристаллическая 101 – 40,0 мг, сахароза (сахар) – 36,0 мг, повидон K-17 – 14,4 мг, коповидон – 5,6 мг, кросповидон – 15,2 мг, тальк – 7,6 мг, кальция стеарат – 7,6 мг. <i>вспомогательные вещества (пленочная оболочка):</i> Aquarius Prime BAN314047 Yellow – 24,0 мг: гипромеллоза – 15,84 мг, титана диоксид – 5,3748 мг, каприл/каприлат (каприловый/каприновый триглицерид) – 2,16 мг, краситель железа оксид желтый – 0,168 мг, краситель железа оксид красный – 0,0012 мг, краситель хинолиновый желтый – 0,456 мг.	Состав 1 таблетка содержит: <i>действующее вещество:</i> N-метил-4-бензилкарбамидопиридиния йодид (Энисамия йодид) – 500,0 мг; <i>вспомогательные вещества (ядро):</i> лактозы моногидрат, целлюлоза микрокристаллическая 101, сахароза (сахар), повидон K-17, коповидон, кросповидон, тальк, кальция стеарат. <i>вспомогательные вещества (пленочная оболочка):</i> Aquarius Prime BAN314047 Yellow: гипромеллоза, титана диоксид, каприл/каприлат (каприловый/каприновый триглицерид), краситель железа оксид желтый, краситель железа оксид красный, краситель хинолиновый желтый.

Старая редакция	Новая редакция
Способ применения и дозы	Способ применения и дозы
<p>Лечение начинать при появлении первых признаков заболевания. Если через 3 дня лечения улучшения не наступает или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом. Применяйте препарат только согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции.</p>	<p>Лечение начинать при появлении первых признаков заболевания. Если через 3 дня лечения улучшения не наступает или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом. Применяйте препарат только согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции.</p>
<p>Препарат НОБАЗИТ® принимают внутрь после еды, не разжевывая.</p>	<p>Препарат НОБАЗИТ® ФОРТЕ принимают внутрь после еды, не разжевывая.</p>
<p>Взрослым по 500 мг (1 таблетка) 3 раза в сутки.</p>	<p>Взрослым по 500 мг (1 таблетка) 3 раза в сутки.</p>
<p>Максимальная разовая доза – 1 г (2 таблетки), суточная – 2 г (4 таблетки).</p>	<p>Максимальная разовая доза – 1 г (2 таблетки), суточная – 2 г (4 таблетки).</p>
<p>Рекомендованный курс лечения от 5 до 7 дней. Детям с 12 лет по 250 мг (1/2 таблетки) 3 раза в сутки на протяжении 7 дней.</p>	<p>Рекомендованный курс лечения от 5 до 7 дней. Детям с 12 лет по 250 мг (1/2 таблетки) 3 раза в сутки на протяжении 7 дней.</p>
Взаимодействие с другими лекарственными средствами	Взаимодействие с другими лекарственными средствами
<p>Взаимодействие с другими лекарственными средствами достаточно не изучено.</p>	<p>Взаимодействие с другими лекарственными средствами достаточно не изучено.</p>
<p>Препарат НОБАЗИТ® усиливает действие антибактериальных и иммуномодулирующих средств. Целесообразным является комбинация данного препарата с аскорбиновой кислотой и другими витаминами. Также препарат НОБАЗИТ® можно назначать одновременно с использованием рекомбинантного интерферона.</p>	<p>Препарат НОБАЗИТ® ФОРТЕ усиливает действие антибактериальных и иммуномодулирующих средств. Целесообразным является комбинация данного препарата с аскорбиновой кислотой и другими витаминами. Также препарат НОБАЗИТ® ФОРТЕ можно назначать одновременно с использованием рекомбинантного интерферона.</p>
<p>Если Вы применяете вышеперечисленные</p>	<p>Если Вы применяете вышеперечисленные или</p>

Старая редакция	Новая редакция
или другие лекарственные препараты (в том числе безрецептурные) перед применением препарата НОБАЗИТ® проконсультируйтесь с врачом.	другие лекарственные препараты (в том числе безрецептурные) перед применением препарата НОБАЗИТ® ФОРТЕ проконсультируйтесь с врачом.

Начальник отдела регистрации
ОАО «Авексима»

В.А. Балабаш



МИНЗДРАВ РОССИИ

МП-006416-13 0421

СОГЛАСОВАНО

Прошито и пронумеровано и скреплено

печатью 3 листа(ов).

Начальник отдела регистрации
ОАО «Авексима»
Балабаш В.А.

(подпись)

«8» 2011 года

М.П.

