

**ПРИМАФУНГИН® - разумная и удобная терапия хронического вульвовагинального кандидоза
(хронической молочницы)**

- Устраняет грибы не только рода *Candida albicans*, но и *Candida non-albicans*¹
- Без развития резистентности в клинической практике¹
- Уникальная основа Суппоцир АМ® способствует равномерному распределению действующего вещества¹
- Возможно применение на всех сроках беременности и при лактации¹

ПРИМАФУНГИН®

Показания к применению: вагиниты, вульвиты, вульвовагиниты, вызванные, главным образом, грибами *Candida*.

МНН: натамицин

Фармакотерапевтическая группа: противогрибковое средство

Код АТХ: G01AA02

Лекарственная форма: суппозитории вагинальные

Активное вещество: натамицин - 100мг.

Основа для суппозитория: уникальная запатентованная форма – Суппоцир АМ для максимально равномерного распределения

Фармакодинамика: противогрибковый полиеновый антибиотик из группы макролидов, имеющий широкий спектр действия. Оказывает выраженное фунгицидное действие. Натамицин связывает стеролы клеточных мембран, нарушая их целостность и функции, что приводит к гибели микроорганизмов. К натамицину чувствительны большинство патогенных дрожжевых грибов, особенно рода *Candida*. Резистентность к натамицину в клинической практике не встречается.

Фармакокинетика: натамицин не оказывает системного действия, т.к. практически не всасывается с поверхности кожи и слизистых оболочек.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания: возможно применение ПРИМАФУНГИНА® в период беременности и лактации.

Способ применения и дозы: интравагинально. У взрослых и девушек (после начала половой жизни) применяют по 1 вагинальному суппозиторию в течение 3-6 дней. Суппозитории вводят во влагалище, в положении лежа, как можно глубже, 1 раз в сутки на ночь. Суппозитории не следует резать на части, поскольку подобное изменение условий хранения препарата может привести к нарушению распределения активного вещества.

Передозировка: в настоящее время о случаях передозировки препарата ПРИМАФУНГИН® не сообщалось.

Взаимодействие с другими лекарственными препаратами: лекарственное взаимодействие препарата ПРИМАФУНГИН® не описано.

Суппозитории вагинальные, №3 и №6.

¹Инструкция по медицинскому применению лекарственного препарата «Примафунгин, суппозитории вагинальные», РУ ЛП-000411 от 10.05.2017

