

# ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

## ВАЛИДОЛ С ИЗОМАЛЬТОМ

### **Регистрационный номер:**

ЛП-004499

### **Торговое наименование:**

ВАЛИДОЛ С ИЗОМАЛЬТОМ

### **Международное непатентованное наименование или группировочное наименование:**

Левоментола раствор в ментил изовалерате

### **Лекарственная форма:**

таблетки подъязычные

### **Состав**

Одна таблетка содержит:

*Действующее вещество:* левоментола раствор в ментил изовалерате (валидол) – 60 мг.  
*Вспомогательные вещества:* изомальт – 670 мг; кремния диоксид коллоидный – 12,5 мг; кальция стеарат – 7,5 мг.

### **Описание**

Круглые, плоскоцилиндрической формы таблетки, белого или белого с сероватыми вкраплениями цвета, с двухсторонней фаской и риской на одной стороне, с характерным запахом ментола.

**Фармакотерапевтическая группа:** коронародилатирующее средство рефлекторного действия.

**Код АТХ:** C01EX.

### **Фармакологические свойства**

#### **Фармакодинамика**

Оказывает седативное действие, обладает умеренным рефлекторным сосудорасширяющим действием, обусловленным раздражением чувствительных нервных окончаний. Стимулирует выработку и высвобождение энкефалинов, эндорфинов и ряда других пептидов, кининов (за счет раздражения рецепторов слизистой оболочки), которые принимают активное участие в регуляции проницаемости сосудов, формировании болевых ощущений. При сублингвальном приеме терапевтический эффект, в среднем, наступает через 5 минут, при этом до 70 % препарата высвобождается в течение 3 минут.

#### **Фармакокинетика**

При сублингвальном применении абсорбируется со слизистой оболочки полости рта. После всасывания биотрансформируется в печени и выводится почками в виде глюкуронидов.

### **Показания к применению**

Функциональная кардиалгия, невроты, а также как противорвотное средство при морской и воздушной болезни.

### **Противопоказания**

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, дефицит сахаразы/изомальтазы, непереносимость фруктозы, глюкозо-галактозная мальабсорбция, возраст до 18 лет (отсутствуют данные по эффективности и безопасности применения препарата у детей).

### **Применение при беременности и в период грудного вскармливания**

Применение препарата при беременности и в период грудного вскармливания возможно в случае, если предполагаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода или ребенка. Необходимо проконсультироваться с врачом.

### **Способ применения и дозы**

Препарат назначают взрослым по 1 таблетке под язык до ее полного рассасывания. Принимают по 1 таблетке

2-3 раза в сутки. Кратность и продолжительность приема определяется в зависимости от эффективности лечения. При отсутствии или недостаточной выраженности терапевтического эффекта в ближайшие 5-10 минут после приема препарата необходимо обратиться к врачу для назначения другой терапии.

### **Побочное действие**

Возможны тошнота, слезотечение, головокружение. При отмене препарата эти побочные эффекты обычно проходят самостоятельно. Возможно развитие аллергических реакций (кожная сыпь, зуд, ангионевротический отек). При появлении побочных эффектов, не описанных в данной инструкции, следует прекратить прием препарата и сообщить об этом лечащему врачу.

### **Передозировка**

**Симптомы:** тошнота, головная боль, резкое снижение артериального давления, угнетение центральной нервной системы, нарушение сердечной деятельности, состояние возбуждения.

**Лечение:** отмена препарата, симптоматическая терапия.

### **Взаимодействие с другими лекарственными препаратами**

При одновременном при-

менении с лекарственными средствами, угнетающими центральную нервную систему, усиливает действие последних.

Одновременное применение препарата с нитратами уменьшает головную боль, которая возникает при их приеме.

### **Особые указания**

Препарат можно принимать людям с сахарным диабетом (не содержит сахара).

Не рекомендуется принимать препарат пациентам с наследственной непереносимостью фруктозы. Не рекомендуется одновременный прием алкоголя.

### **Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами**

При приеме препарата необходимо соблюдать осторожность при управлении транспортными средствами и занятии другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

### **Форма выпуска**

Таблетки подъязычные, 60 мг. По 10 таблеток в контурную ячейковую упаковку из пленки поливинилхлоридной и фольги алюминиевой.

По 20 таблеток в банку сте-

кланную.

1, 2 или 5 контурных ячейковых упаковок или 1 банку с инструкцией по медицинскому применению помещают в пачку из картона.

### **Условия хранения**

Хранить при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

### **Срок годности**

2 года.

Не применять по истечении срока годности.

### **Условия отпуска**

Отпускают без рецепта.

### **Наименование юридического лица, на имя которого выдано регистрационное удостоверение, адрес**

ОАО «Авексима»  
125284, Россия, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 31А, стр. 1.

### **Производитель/**

### **Организация, принимающая претензии потребителей**

ОАО «Ирбитский химфармзавод»  
623856, Россия, Свердловская обл., г. Ирбит, ул. Кирова, д. 172.

Тел./факс: (34355) 3-60-90.

### **Адрес производства:**

Свердловская обл., г. Ирбит, ул. Карла Маркса, д. 124-а.