

## **ПРИМАФУНГИН® - разумная терапия вульвовагинального кандидоза (молочницы)**

- Устраняет грибы рода *Candida albicans* и non-*albicans*<sup>1</sup>
- Без развития резистентности в клинической практике<sup>1</sup>
- Уникальная основа Суппоцир АМ® способствует равномерному распределению действующего вещества<sup>1</sup>
- Возможно применение на всех сроках беременности и при лактации<sup>1</sup>

### **ПРИМАФУНГИН®**

**Показания к применению:** вагиниты, вульвиты, вульвовагиниты, вызванные, главным образом, грибами *Candida*.

**МНН:** натамицин

**Фармакотерапевтическая группа:** противогрибковое средство.

**Код АТХ:** G01AA02

**Лекарственная форма:** суппозитории вагинальные.

**Активное вещество:** натамицин -100мг.

**Основа для суппозитория:** уникальная запатентованная форма – Суппоцир АМ® для максимально равномерного распределения действующего вещества.

**Фармакодинамика:** противогрибковый полиеновый антибиотик из группы макролидов, имеющий широкий спектр действия. Оказывает выраженное фунгицидное действие. Натамицин связывает стеролы клеточных мембран, нарушая их целостность и функции, что приводит к гибели микроорганизмов. К натамицину чувствительны большинство патогенных дрожжевых грибов, особенно рода *Candida*. Резистентность к натамицину в клинической практике не встречается.

**Фармакокинетика:** натамицин не оказывает системного действия, т.к. практически не всасывается с поверхности кожи и слизистых оболочек.

**Применение при беременности и в период грудного вскармливания:** возможно применение ПРИМАФУНГИНА® в период беременности и лактации.

**Способ применения и дозы:** интравагинально. У взрослых и девушек (после начала половой жизни) применяют по 1 вагинальному суппозиторию в течение 3-6 дней. Суппозитории вводят во влагалище, в положении лежа, как можно глубже, 1 раз в сутки на ночь. Суппозитории не следует резать на части, поскольку подобное изменение условий хранения препарата может привести к нарушению распределения активного вещества.

**Передозировка:** в настоящее время о случаях передозировки препарата ПРИМАФУНГИН® не сообщалось.

**Взаимодействие с другими лекарственными препаратами:** лекарственное взаимодействие препарата ПРИМАФУНГИН® не описано.

Суппозитории вагинальные, №3 и №6.

---

<sup>1</sup>Инструкция по медицинскому применению лекарственного препарата «Примафунгин, суппозитории вагинальные», РУ ЛП-000411

