

ИНСТРУКЦИЯ

по медицинскому применению препарата

Фурацилин

Регистрационный номер:

Торговое название: Фурацилин

Международное непатентованное название: нитрофурал

Лекарственная форма: таблетки для приготовления раствора для местного и наружного применения.

Состав:

Состав на одну таблетку: *активное вещество:* нитрофурал (фурацилин) – 20 мг;
вспомогательные вещества: натрия хлорид.

Описание

Таблетки желтого или зеленовато-желтого цвета, с неравномерной окраской поверхности, плоскоцилиндрические с риской и фаской.

Фармакотерапевтическая группа: противомикробное средство – нитрофуран.

Код АТХ [D08AF01]

Фармакологическое действие

Противомикробное средство. Активен в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий (в том числе *Staphylococcus* spp., *Streptococcus* spp., *Escherichia coli*, *Clostridium perfringens*). Эффективен при устойчивости микроорганизмов к другим противомикробным средствам (не из группы нитрофурана). Обладает отличным от других химиотерапевтических средств механизмом действия: микробные флавопротеины восстанавливают 5-нитрогруппу, образующиеся высокореактивные аминопроизводные изменяют конформацию белков, в том числе рибосомальных, и других макромолекул, вызывая гибель клеток. Устойчивость развивается медленно и не достигает высокой степени.

Фармакокинетика

При местном и наружном применении всасывание незначительное. Проникает через гистогематические барьеры и равномерно распределяется в жидкостях и тканях. Основной путь метаболизма - восстановление нитрогруппы. Выводится почками и частично с желчью.

Показания к применению

Наружно: гнойные раны, пролежни, ожоги II-III ст., мелкие повреждения кожи (в том числе ссадины, царапины, трещины, порезы).

Местно: блефарит, конъюнктивит, фурункул наружного слухового прохода; остеомиелит, эмпиема околоносовых пазух, плевры (промывание полостей); острый наружный и средний отит, ангина, стоматит, гингивит.

Противопоказания

Гиперчувствительность, кровотечения, аллергодерматозы.

Применение при беременности и лактации

Допускается применение при беременности и лактации.

Способ применения и дозы

Местно, наружно.

Наружно, в виде водного 0.02% (1:5000) или спиртового 0.066% (1:1500) растворов - орошают раны и накладывают влажные повязки.

Внутриполостно (водный раствор): эмпиема придаточных пазух носа (в т.ч. при гайморите) - промывание полости; остеомиелит после операции - промывание полости с последующим наложением влажной повязки; эмпиема плевры - после удаления гноя проводят промывание плевральной полости и вводят 20-100 мл водного раствора. Для промывания мочеиспускательного канала и мочевого пузыря применяют водный раствор с экспозицией 20 мин.

При отитах - спиртовой раствор, нагретый до температуры тела, ежедневно закапывается по 5-6 капель в наружный слуховой проход.

Блефарит, конъюнктивит - инстилляцией водного раствора в конъюнктивальный мешок.

Для полоскания рта и горла - 20 мг (1 таблетка) растворяют в 100 мл воды.

Для приготовления водного раствора 1 часть нитрофураля растворяют в 5000 частей 0,9% раствора натрия хлорида или дистиллированной воды. Спиртовой раствор готовят на 70% этаноле.

Побочное действие

Возможны аллергические реакции: кожный зуд, дерматит.

Передозировка

О случаях передозировки не сообщалось.

Взаимодействие

Взаимодействие с другими лекарственными средствами не описано.

Форма выпуска.

Таблетки для приготовления раствора для местного и наружного применения 20 мг.

По 10 таблеток в контурную ячейковую или контурную безъячейковую упаковку.

2 контурные ячейковые упаковки с инструкцией по применению помещают в пачку из картона. 500 контурных безъячейковых упаковок или 1000 контурных ячейковых упаковок с равным количеством инструкций по применению помещают в коробку из картона (для стационаров).

Условия хранения.

Хранить в сухом, защищенном от света месте при температуре от 2 до 25°C.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности.

5 лет.

По истечении срока годности препарат не применять.

Условия отпуска из аптек.

Без рецепта.

Производитель

ОАО «Ирбитский химико-фармацевтический завод»

623856, Свердловская обл., г. Ирбит, ул. Кирова, 172

Тел. (343-55) 3-61-01; факс 3-60-73.

Генеральный директор

ОАО «Ирбитский химико-фармацевтический завод»



Л.А. Солодухина

