ЛП-№(004288)-(РГ-RU) от 26.08.2026

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 14.07.2026 № 13949
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0018)

Листок-вкладыш – информация для пациента

ФУРАВЕКСИМ, 20 мг, таблетки шипучие для приготовления раствора для местного и наружного применения

ФУРАВЕКСИМ, 20 мг, таблетки шипучие для приготовления раствора для местного и наружного применения с ароматом черной смородины

Действующее вещество: нитрофурал

Перед применением препарата полностью прочитайте листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для Вас сведения.

- Данный лекарственный препарат является препаратом, отпускаемым без рецепта.
- Всегда применяйте препарат в точности с листком-вкладышем или рекомендациями лечащего врача, работника аптеки или медицинской сестры.
- Сохраните листок-вкладыш. Возможно, Вам потребуется прочитать его еще раз.
- Если Вам нужны дополнительные сведения или рекомендации, обратитесь к работнику аптеки.
- Если у Вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу, работнику аптеки или медицинской сестре. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в разделе 4 листка-вкладыша.
- Если состояние не улучшается или оно ухудшается, Вам следует обратиться к врачу.

Содержание листка-вкладыша

1. Что из себя представляет препарат ФУРАВЕКСИМ, и для чего его применяют.
2. О чем следует знать перед применением препарата ФУРАВЕКСИМ.
3. Применение препарата ФУРАВЕКСИМ.
4. Возможные нежелательные реакции.
5. Хранение препарата ФУРАВЕКСИМ.
6. Содержимое упаковки и дополнительные сведения.

1. Что из себя представляет препарат ФУРАВЕКСИМ, и для чего его применяют

ФУРАВЕКСИМ относится к группе противомикробных лекарственных средств – нитрофуранам. Препарат содержит действующее вещество нитрофурал (фурацилин), которое вызывает гибель бактерий и простейших микроорганизмов, способных вызывать инфекции у человека.

Показания к применению

Препарат ФУРАВЕКСИМ применяется у взрослых и детей в составе комплексной терапии по следующим показаниям.

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 14.07.2026 № 13949
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0018)

Наружно: гнойные раны, пролежни, ожоги II степени, мелкие повреждения кожи (в том числе ссадины, царапины, трещины, порезы).

Местно: блефарит, конъюнктивит, острый тонзиллит, стоматит, гингивит.

Если улучшение не наступило, или Вы чувствуете ухудшение, необходимо обратиться к врачу.

2. О чем следует знать перед применением препарата ФУРАВЕКСИМ

Противопоказания

Не применяйте препарат ФУРАВЕКСИМ:

- если у Вас аллергия на нитрофурал, производные нитрофурана и/или любые другие компоненты препарата (перечисленные в разделе 6 листка-вкладыша);
- при наличии кровотечения в месте применения;
- при аллергических заболеваниях кожи (аллергодерматозы);
- если у Вас есть тяжелые нарушения функции почек.

Особые указания и меры предосторожности

Перед применением препарата ФУРАВЕКСИМ проконсультируйтесь с лечащим врачом, работником аптеки или медицинской сестрой.

Сообщите врачу, если у Вас имеется нарушение функций почек, так как при применении препарата ФУРАВЕКСИМ при тяжелых ожогах на больших поверхностях, возможно прогрессирование почечной недостаточности.

Не смешивайте приготовленный раствор ФУРАВЕКСИМ со следующими лекарственными средствами: с эпинефрином (адреналин), прокаином (новокаин), тетракаином, резорцинолом (резорцин) и другими химическими веществами, относящимися к группе восстановителей, ввиду их несовместимости с фурацилином. При смешивании перечисленных веществ с раствором ФУРАВЕКСИМ, он разлагается с образованием химических соединений розового или буроватого цвета и становится непригодным к применению.

Препарат ФУРАВЕКСИМ также несовместим с калия перманганатом (марганцовка), перекисью водорода и другими химическими веществами, относящимися к группе окислителей. Не смешивайте приготовленный раствор ФУРАВЕКСИМ с перечисленными веществами ввиду возможности его окисления и дальнейшей непригодности к применению.

Другие препараты и препарат ФУРАВЕКСИМ

Сообщите лечащему врачу или работнику аптеки о том, что Вы принимаете, недавно принимали или можете начать принимать какие-либо другие препараты.

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 14.07.2026 № 13949
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0018)

Беременность и грудное вскармливание

Если Вы беременны или кормите грудью, предполагаете, что забеременели, или планируете беременность, перед началом применения препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Применение препарата ФУРАВЕКСИМ при беременности и кормлении грудью возможно только в крайних случаях, которые определяет врач.

Управление транспортными средствами и работа с механизмами

Препарат не влияет на способность управлять транспортным средством или потенциально опасными механизмами, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

3. Применение препарата ФУРАВЕКСИМ

Рекомендуемая доза

Всегда применяйте препарат в полном соответствии с листком-вкладышем или с рекомендациями лечащего врача или работника аптеки. При появлении сомнений посоветуйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Водный 0,02 % раствор нитрофурала готовят непосредственно перед применением: 1 таблетку шипучую (20 мг) растворяют в 100 мг дистиллированной или кипяченой воды. Для более быстрого растворения рекомендуется кипящая или горячая вода. Затем раствор охлаждают до комнатной температуры.

Наружно

Орошают раны, пролежни, ожоги II степени, мелкие повреждения кожи (в том числе ссадины, царапины, трещины, порезы) и накладывают влажные повязки.

Местно

Блефарит, конъюнктивит – инстилляция раствора в конъюнктивальный мешок.

При остром тонзиллите, стоматите, гингивите – полоскание рта и горла теплым раствором по 100 мл 2-3 раза в день.

Продолжительность терапии

Продолжительность лечения определяет врач в зависимости от характера заболевания.

При наличии вопросов по применению препарата обратитесь к лечащему врачу, работнику аптеки или медицинской сестре.

4. Возможные нежелательные реакции

Подобно всем лекарственным препаратам, ФУРАВЕКСИМ может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех.

Прекратите применение препарата ФУРАВЕКСИМ и немедленно обратитесь за медицинской помощью в случае возникновения одного из следующих признаков аллергической реакции (частота возникновения неизвестна):

- аллергическое воспаление кожи (дерматит);

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 14.07.2026 № 13949
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0018)

- зуд кожи.

Сообщение о нежелательных реакциях

Если у Вас возникают какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с врачом, работником аптеки или медицинской сестрой. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в листке-вкладыше. Вы также можете сообщить о нежелательных реакциях напрямую через систему сообщения государства-члена Евразийского экономического союза. Сообщая о нежелательных реакциях, Вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

Российская Федерация

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения

109012, г. Москва, Славянская площадь, д. 4, стр. 1

Телефон: +7 800 550-99-03

Электронная почта: pharm@roszdravnadzor.gov.ru или npr@roszdravnadzor.gov.ru

Сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: https://www.roszdravnadzor.gov.ru

Республика Армения

«Центр экспертизы лекарств и медицинских технологий» ГНКО

0051, г. Ереван, пр. Комитаса 49/5

Телефон: (+374 10) 20-05-05; (+374 96) 22-05-05

Электронная почта: info@ampra.am; vigilance@pharm.am

Сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: https://www.pharm.am

Республика Беларусь

ГУ «Госфармнадзор»

220030, г. Минск, ул. Мясникова, д. 32-2

Телефон: +375 (17) 271-41-76, +375 (17) 242-00-29

Факс: +375 (17) 271-25-75

Электронная почта: pharm@gospharmnadzor.by

Сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: https://gospharmnadzor.by

Республика Казахстан

РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий» Комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан

010000, г. Астана, район Байконыр, ул. А. Иманова, 13

Телефон: +7 (7172) 235 - 135

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 14.07.2026 № 13949
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0018)

Электронная почта: pdlc@dari.kz; farm@dari.kz

Сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: https://www.ndda.kz

Кыргызская Республика

Департамент лекарственных средств и медицинских изделий при Министерстве здравоохранения Кыргызской Республики

Адрес: 720044, г. Бишкек, ул. 3-я линия, 25

Телефон: 0800-800-26-26; +996 (312) 21-92-78

Электронная почта: pharm@dlsmi.kg

Сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: https://www.dlsmi.kg

5. Хранение препарата ФУРАВЕКСИМ

Храните лекарственный препарат в недоступном для детей месте.

Не применяйте препарат после истечения срока годности (срока хранения), указанного на картонной пачке после «Годен до:».

Датой истечения срока годности является последний день месяца.

Храните в оригинальной упаковке (пачке) для защиты от света при температуре не выше 25 °С.

Не выбрасывайте (не выливайте) препарат в канализацию. Уточните у работника аптеки, как следует утилизировать (уничтожать) препараты, которые больше не потребуются. Эти меры позволят защитить окружающую среду.

6. Содержимое упаковки и прочие сведения

Препарат ФУРАВЕКСИМ содержит

Действующим веществом является нитрофурал.

Каждая таблетка содержит 20 мг нитрофурала (фурацилина).

ФУРАВЕКСИМ, 20 мг, таблетки шипучие для приготовления раствора для местного и наружного применения

Прочими вспомогательными веществами являются: винная кислота, натрия гидрокарбонат, натрия карбонат, натрия хлорид, макрогол 20000, повидон К25.

ФУРАВЕКСИМ, 20 мг, таблетки шипучие для приготовления раствора для местного и наружного применения с ароматом черной смородины

Прочими ингредиентами (вспомогательными веществами) являются: винная кислота, натрия гидрокарбонат, натрия карбонат, натрия хлорид, макрогол 20000, повидон К25, ароматизатор «Черная смородина».

Внешний вид препарата ФУРАВЕКСИМ и содержимое упаковки

Таблетки шипучие для приготовления раствора для местного и наружного применения.

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 14.07.2026 № 13949
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0018)

Круглые, плоскоцилиндрической формы таблетки, от светло-желтого до желтого цвета с вкраплениями, с фаской на обеих сторонах. Допускается шероховатость поверхности таблетки.

По 2 или 4 таблетки в контурную безъячейковую упаковку (стрип) из материала упаковочного комбинированного на бумажной основе.

По 5 или 10 контурных безъячейковых упаковок (стрипов) по 2 таблетки или 5 контурных безъячейковых упаковок (стрипов) по 4 таблетки с листком-вкладышем помещают в пачку из картона.

Таблетки шипучие для приготовления раствора для местного и наружного применения с ароматом черной смородины

Круглые, плоскоцилиндрической формы таблетки, от светло-желтого до желтого цвета с вкраплениями, с фаской на обеих сторонах. С характерным запахом. Допускается шероховатость поверхности таблетки.

По 2 или 4 таблетки в контурную безъячейковую упаковку (стрип) из мягкой алюминиевой фольги, ламинированной низкоплотным полиэтиленом или из комбинированного многослойного материала (полиэтилентерефталат/алюминий /полиэтилен).

По 5 или 10 контурных безъячейковых упаковок (стрипов) по 2 таблетки или 5 контурных безъячейковых упаковок (стрипов) по 4 таблетки с листком-вкладышем помещают в пачку из картона.

Категория отпуска лекарственного препарата

Лекарственный препарат относится к категории отпуска без рецепта.

Держатель регистрационного удостоверения

Российская Федерация
ОАО «Авексима»
125284, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 31А, стр. 1
Телефон: +7 (495) 258-45-28
Электронная почта: info@avexima.ru

Производитель (выпускающий контроль качества)

Российская Федерация
АО «Ирбитский химфармзавод»
Свердловская обл., г. Ирбит, ул. Карла Маркса, д. 124, стр. 1.

За любой информацией о препарате следует обращаться к местному представителю держателя регистрационного удостоверения:

Российская Федерация

ОАО «Авексима»
125284, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 31А, стр. 1
Телефон: +7 (495) 258-45-28
Электронная почта: info@avexima.ru

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 14.07.2026 № 13949
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0018)

Республика Армения

ТОО «Adalan»
050057, г. Алматы, ул. Тимирязева, 42, пав. 23, оф. 202.
Телефон: +374-914-027-17
Электронная почта: pv@adalan.kz

Республика Беларусь

ТОО «Adalan»
050057, г. Алматы, ул. Тимирязева, 42, пав. 23, оф. 202
Телефон: +375-29-551-25-10
Электронная почта: pv@adalan.kz

Республика Казахстан

ТОО «Adalan»
050057, г. Алматы, ул. Тимирязева, 42, пав. 23, оф. 202
Телефон: +7 (701) 217-24-57
Электронная почта: pv@adalan.kz

Кыргызская Республика

ТОО «Adalan»
050057, г. Алматы, ул. Тимирязева, 42, пав. 23, оф. 202
Телефон: +996-557-870-101
Электронная почта: pv@adalan.kz

Прочие источники информации

Листок-вкладыш доступен в едином реестре зарегистрированных лекарственных средств Евразийского экономического союза и на официальном сайте уполномоченного органа (экспертной организации) https://grls.rosminzdrav.ru/ (https://lk.regmed.ru/Register/EAEU_SmPC).